

## Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

**Sunitinib ratiopharm 12,5 mg kovat kapselit**  
**Sunitinib ratiopharm 25 mg kovat kapselit**  
**Sunitinib ratiopharm 50 mg kovat kapselit**  
sunitinibi

**Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.**

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysyttävästä, käännny lääkärin tai apteekkien henkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritetty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

**Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:**

1. Mitä Sunitinib ratiopharm on ja mielin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Sunitinib ratiopharmia
3. Miten Sunitinib ratiopharmia otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Sunitinib ratiopharmin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### **1. Mitä Sunitinib ratiopharm on ja mielin sitä käytetään**

Sunitinib ratiopharmin vaikuttava aine, sunitinibi, on proteiinikinaasin estääjä, jolla hoidetaan syöpää estämällä tietyn valkuaisaineryhmän toimintaa. Tämän valkuaisaineryhmän tiedetään osallistuvan syöpäsolujen kasvuun ja leviämiseen.

Sunitinib ratiopharmia käytetään seuraavien syöpätyyppien hoitoon aikuisilla:

- gastrointestinaalinen stroomakasvain (GIST), joka on mahalaukun ja suoliston syöpä. Sunitinib ratiopharmia käytetään, kun imatinibi (toinen syöpälääke) ei enää tehoa tai sitä ei voida käyttää.
- metastasoitunut munuaissolukarsinooma (MRCC), joka on muualle elimistöön levinnyt munuaissyöpä.
- haiman neuroendokriinin kasvain (haiman NET) (haiman hormoneja erittävien solujen kasvain), joka on edennyt tai jota ei voida leikata.

Jos sinulla on kysyttävä Sunitinib ratiopharmin vaikutustavasta tai siitä, miksi lääkettä on määritetty sinulle, käännny lääkärin puoleen.

### **2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Sunitinib ratiopharmia**

#### **ÄLÄ käytä Sunitinib ratiopharmia**

- jos olet allerginen sunitinibileille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

#### **Varoitukset ja varotoimet**

#### **Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Sunitinib ratiopharmia:**

- **Jos sinulla on korkea verenpaine.** Sunitinib ratiopharm voi nostaa verenpainetta. Lääkäri saattaa tarkistaa verenpaineesi Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana, ja saatat tarvittaessa saada lääkehoitoa verenpaineen alentamiseksi.
- **Jos sinulla on tai on ollut verisairaus, verenvuoto-ongelmia tai mustelmia.** Sunitinib

ratiopharm -hoito saattaa suurentaa verenvuotojen vaaraa tai muuttaa tiettyjen verisolujen määärää, mikä voi aiheuttaa anemiaa tai vaikuttaa veren hyytymiseen. Jos käytät varfariinia tai asenokumarolia, jotka ovat veren hyytymisen estoon käytettäviä verenohennuslääkeitä, verenvuotojen vaara saattaa olla suurentunut. Kerro lääkärille, jos saat verenvuodon Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana.

- **Jos sinulla on sydänvaivoja.** Sunitinib ratiopharm voi aiheuttaa sydänvaivoja. Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy voimakasta väsymystä, hengästyneisyyttä tai jalkaterien ja nilkkojen turpoamista.
- **Jos sinulla on epätavallisia muutoksia sydämen rytmissä.** Sunitinib ratiopharm voi aiheuttaa sydänrytmin poikkeavuuksia. Lääkäri saattaa ottaa sinulta sydänsähkökäyrän näiden vaivojen arvioimiseksi Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana. Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy huimausta, pyörtymistä tai epätavallista sydämen sykettä Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana.
- **Jos sinulla on äskettäin ilmennyt verihyytymiä verisuonissa (laskimoissa tai valtimoissa), mukaan lukien aivohalvaus, sydänkohtaus, veritulppa tai verisuonitukos.** Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana mm. seuraavia oireita: kipua tai puristuksen tunnetta rinnassa, kipua käsivarsissa, selässä, niskassa tai leuassa, hengenahdistusta, tunnottomuutta tai heikkoutta toisella puolella kehoa, puhevaikeuksia, päänsärkyä tai heitehuimausta.
- Jos sinulla on tai on ollut aneurysma (verisuonen seinämän laajentuma ja heikentymä) tai verisuonen seinämän repeämä.
- **Jos sinulla on tai on ollut pienien verisuonten vaurioita, jota kutsutaan tromboottiseksi mikroangiopatiaksi (TMA).** Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy kuumetta, uupumusta, väsymystä, mustelmia, verenvuotoa, turvotusta, sekavuutta, näönmenetystä ja kouristuskohtauksia.
- **Jos sinulla on diagnostitu suuren aortta-verisuonen laajentuma tai ”pullistuma”, jota kutsutaan aortan aneurysmaksi.**
- **Jos sinulla on aiemmin ollut aortan seinämän repeämä, jota kutsutaan aortan dissekaatioksi.**
- **Jos sinulla on jokin kilpirauhasvaiva.** Sunitinib ratiopharm voi aiheuttaa kilpirauhasvaivoja. Ota yhteys lääkäriin, jos väsyt aiempaa helpommin, palelet muita ihmisiä herkemmin tai äänesi madaltuu Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana. Kilpirauhasen toiminta on tarkistettava ennen Sunitinib ratiopharmin käytön aloittamista ja säädöllisin väliajoin käytön aikana. Jos kilpirauhanen ei tuota riittävästi kilpirauhashormonia, sinulle saatetaan antaa kilpirauhashormonin korvaushoitoa.
- **Jos sinulla on tai on ollut haima- tai sappirakkosairaus.** Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista tai löydöksistä: kipua vatsan alueella (ylävatsassa), pahoinvointia, oksentelua ja kuumetta. Nämä voivat johtua haima- tai sappirakkotulehduksesta.
- **Jos sinulla on tai on ollut maksavaivoja.** Kerro lääkärille, jos sinulle ilmaantuu Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana jokin seuraavista maksan toimintahäiriöön viittaavista merkeistä tai oireista: kutinaa, silmien tai ihon keltaisuutta, tummaa virtsaa ja kipua tai epämiellyttäviä tuntemuksia mahanseudun oikeassa yläosassa. Lääkärin on otettava verikokeita ennen Sunitinib ratiopharm -hoitoa ja sen aikana tarpeen mukaan tarkistaakseen maksasi toiminnan.
- **Jos sinulla on tai on ollut munuaisvaivoja.** Lääkäri tarkkailee munuaistesi toimintaa.
- **Jos olet menossa leikkaukseen tai sinulle on äskettäin tehty leikkaus.** Sunitinib

ratiopharm saattaa vaikuttaa haavojen paranemiseen. Jos sinulle tehdään leikkaus, Sunitinib ratiopharm -hoito tavallisesti keskeytetään. Lääkäri päättää, milloin voit jatkaa Sunitinib ratiopharm -hoitoa.

- **Sinua voidaan pyytää tarkistuttamaan hampaidesi kunto ennen Sunitinib ratiopharm -hoidon aloittamista.**
  - Jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut suu-, hammas- ja/tai leukakipua, turvotusta tai haavaumia suun sisällä, tunnottomuutta tai painon tunnetta leuassa, tai hampaiden löystymistä, sinun on **heti** otettava yhteys lääkäriin ja hammaslääkäriin.
  - Jos tarvitset hampaiden hoitotoimenpiteitä tai hammaskirurgiaa, kerro hammaslääkärille, että saat Sunitinib ratiopharm -hoitoa erityisesti, jos saat tai olet aikaisemmin saanut laskimoon annettavaa bisfosfonaattihoitoa. Bisfosfonaatit ovat lääkkeitä, joita käytetään luuhun liittyvien sairauksien ehkäisyyn ja joita olet vainut saada muiden sairauksien hoitoon.
- **Jos sinulla on tai on ollut ihmisen kudoksen sairaus.** Tämän lääkkeen käytön aikana voi ilmetä *"pyoderma gangrenosum"* (kivulias ihmisen haavautuminen) tai *"nekrotisoiva faskiitti"* (nopeasti leviävä ihmisen pehmytkudoksen infektio, joka voi olla hengenvaarallinen). Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos ihovaurion ympäristössä ilmenee infektion oireita, mukaan lukien kuumetta, kipua, punoitusta, turvotusta, märkävuotoa tai verenvuotoa. Tämä tapahtuma paranee yleensä sunitinibin käytön keskeyttämisen jälkeen. Vakavia ihottumia (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi ja *erythema multiforme*) on raportoitu sunitinibin käytön aikana. Ensimmäisenä oireena ovat vartalolla esiintyvät punertavat sisäkkäisiä renkaita sisältävät läiskät tai pyöreät täplät, joiden keskellä on usein rakkula. Ihottuma voi pahentua laaja-alaiseksi ihmisen rakkulamuodostukseksi tai kuoriutumiseksi, mikä voi olla henkeä uhkaavaa. Jos saat ihottuman tai tällaisia ihmisen-oireita, ota **heti** yhteys lääkäriin.
- **Jos sinulla esiintyy tai on esiintynyt kouristuskohtauksia.** Ilmoita heti lääkärille, jos sinulla ilmenee korkeaa verenpainetta, päänsärkyä tai näönmenetystä.
- **Jos sinulla on diabetes.** Diabeetikkojen verensokeriarvo tulee tarkistaa säännöllisesti, jotta diabeteslääkevalmisteen annosta voidaan tarvittaessa muuttaa liian matalan verensokerin riskin minimoimiseksi. Ilmoita mahdollisimman pian lääkärille, jos sinulla ilmenee jokin matalan verensokerin merkki tai oire (väsymys, sydämentykyykset, hikoilu, näläntunne ja tajunnanmenetyksessä).

## Lapset ja nuoret

Sunitinib ratiopharmin käyttöä ei suositella alle 18-vuotiaille.

## Muut lääkevalmisteet ja Sunitinib ratiopharm

Kerro lääkärille tai apteekkienkilokunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määritellyt.

Jotkut lääkkeet voivat vaikuttaa Sunitinib ratiopharmin pitoisuuteen elimistössäsi. Kerro lääkärille, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät jotakin seuraavista lääkeaineista:

- ketokonatsoli, itrakonatsoli – sieni-infektioiden hoitoon
- erytromysiini, klaritromysiini, rifampisiini – infektioiden hoitoon
- ritonaviiri – HIV-infektion hoitoon
- deksametasoni – kortikosteroidi, jota käytetään useiden sairauksien hoitoon (kuten allergisiin oireisiin ja hengitys- tai ihosairauksiin)
- fenytoini, karbamatepiini, fenobarbitaali – epilepsian ja muiden neurologisten sairauksien hoitoon
- rohdosvalmisteet, jotka sisältävät mäkkikuusmaa (*Hypericum perforatum*) – masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon.

## **Sunitinib ratiopharm ruoan ja juoman kanssa**

Vältä greippimehun juomista Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana.

## **Raskaus ja imetyks**

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet hedelmällisessä iässä, käytä luotettavaa raskaudenehkäisyä Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana.

Jos imetät, kerro siitä lääkärillesi. Älä imetä Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana.

## **Ajamineen ja koneiden käyttö**

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. Jos sinulla ilmenee huimausta tai tunnet itsesi poikkeuksellisen väsyneeksi, noudata erityistä varovaisuutta ajaessasi tai käyttäässäsi koneita. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksi. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilokunnan kanssa, jos olet epävarma.

## **Sunitinib ratiopharm sisältää natriumia**

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

## **3. Miten Sunitinib ratiopharmia otetaan**

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrittänyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma.

Lääkäri määräää juuri sinulle sopivan annoksen, joka riippuu hoidettavan syövän tyypistä. Jos saat hoitoa:

- gastrointestinaiseen stroomakasvaimeen tai munuaissyyppään: tavanomainen annos on 50 mg kerran vuorokaudessa 28 päivän (4 viikon) ajan, minkä jälkeen pidetään 14 päivän (2 viikon) hoitotauko (ei lääkitystä). Tästä muodostuu kuuden viikon hoitosykli.
- haiman neuroendokriiniseen kasvaimeen: tavanomainen annos on 37,5 mg vuorokaudessa ilman hoitotaukoaa.

Lääkäri päättää sinulle sopivan annoksen sekä Sunitinib ratiopharm -hoidon mahdollisesta keskeyttämisestä ja sen ajankohdasta.

Sunitinib ratiopharmin voi ottaa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

## **Jos otat enemmän Sunitinib ratiopharmia kuin sinun pitäisi**

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkystytietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Voit tarvita lääkärin hoitoa.

## **Jos unohtat ottaa Sunitinib ratiopharmia**

Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.

## **4. Mahdolliset haittavaikutukset**

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista (ks. myös kohta **Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Sunitinib ratiopharmia**):

**Sydänsyöpät.** Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy voimakasta väsymystä, hengästyneisyyttä tai jalkaterien ja nilkkojen turvotusta. Nämä voivat olla oireita sydänsairaudesta, kuten esim. sydämen vajaatoiminnasta ja sydänlihaksen sairaudesta (kardiomyopatiasta).

**Keuhko- tai hengitysvaihat.** Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee yskää, rintakipua, äkillistä hengästyneisyyttä tai veriysköksiä. Nämä voivat olla keuhkoveritulpan oireita. Se on tila, jossa verihyytyvä kulkeutuu keuhkoihin.

**Munuaismuodot.** Kerro lääkärille, jos virtsaamistihetyesi muuttuu tai virtsaamistarpeesi häviää. Nämä voivat olla munuaisten vajaatoiminnan oireita.

**Verenvuoto.** Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista tai vakavia verenvuotohäiriöitä Sunitinib ratiopharm -hoidon aikana: kivulias vatsan turvotus, verioksennus, mustat ja tahmeat ulosteet, verivirtsaus, päänsärky tai mielentilan muutokset, veren tai veriyskosten yskiminen keuhkoista tai hengitysteistä.

**Kasvaimen tuhoutumisesta johtuva puhkeama ruoansulatuskanavassa.** Kerro lääkärille, jos sinulla ilmenee vaikeaa vatsakipua, kuumetta, pahoinvointia, oksentelua, verta ulosteissa tai muutoksia suolen toiminnassa.

Sunitinib ratiopharmia käytettäessä ilmenevät muut haittavaikutukset:

**Hyvin yleiset:** voivat esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä

- verihyytyiden, punasolujen ja/tai valkosolujen (esim. neutrofilien) määrän väheneminen
- hengenahdistus
- korkea verenpaine
- voimakas väsymys, voimattomuus
- kudosten turpoaminen, joka johtuu nesteen kertymisestä ihon alle ja silmien ympärille, syvä allerginen ihotulehdus
- suukipu/-ärsytys, suun haavautuminen/tulehdus/kuivuus, makuaistin häiriöt, mahavaivat, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, ummetus, vatsakipu tai vatsan turpoaminen, ruokahanmunen menetyksellä tai heikkeneminen
- kilpirauhasen toiminnan heikkeneminen (kilpirauhasen vajaatoiminta)
- heitehuimaus.
- päänsärky
- nenäverenvuoto
- selkäkipu, nivelkipu
- raajakipu
- ihon kellertäminen/ihon värjätyminen, ihon liiallinen pigmentoituminen (tummuminen), hiusten värimuutokset, ihottuma kämmenissä ja jalkapohjissa, ihottuma, ihon kuivuminen
- yskä
- kuume
- nukahtamisvaikeudet.

**Yleiset:** esiintyvät enintään 1 henkilöllä 10:stä

- verihyytyvä verisuonissa
- riittämätön verenvirtaus sydänlihakseen, mikä johtuu sepelvaltimoiden tukkeutumisesta tai ahtautumisesta
- rintakipu
- sydämen pumppaan verimäären väheneminen
- nesteen kertyminen elimistöön, mukaan lukien keuhkojen ympärille
- infektiot
- vaikean infektion aiheuttama komplikaatio (verenkierrossa oleva infektio), joka voi johtaa kudosvauroon, elimen toiminnan häiriöön ja kuolemaan

- matala verensokeri (ks. kohta 2)
- proteiinien erityminen virtsaan (valkuaisvirtsaisuus), joka voi joskus aiheuttaa turvotusta influenssan kaltainen oireisto
- epänormaalit verikokeiden tulokset, haima- ja maksaentsyyymiärvot mukaan lukien korkea virtsahappopitoisuus veressä
- peräpukamat, peräsuolikipu, verenvuoto ikenistä, nielemisvaikeudet tai -kyvyttömyys
- polttava tunne tai kipu kielessä, ruoansulatuskanavan limakalvon tulehdus, ilmavaivat painonlasku
- tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvä kipu (kipu lihaksissa ja luissa), lihasheikkous, lihasväsymys, lihaskipu, lihaskouristikset
- nenän kuivuminen, nenän tukkoisuus
- kyynelnesteen lisääntyminen
- epätavalliset ihotuntemukset, kutina, ihon hilseily tai ihotulehdus, rakkulat, akne, kynsien väriätyminen, hiustenlähtö
- epätavalliset tuntemukset raajoissa
- epätavallisesti vähentynyt tai lisääntynyt herkkyyys, erityisesti tuntoherkkyyys
- närästys
- elimistön kuivuminen
- kuumat aallot
- epänormaalillaan värisen virtsa
- masennus
- vilunväristykset.

**Melko harvinaiset:** esiintyvät enintään 1 henkilöllä 100:sta

- hengenvaarallinen infektio pehmytkudoksessa, mukaan lukien peräaukon ja sukupuolielinten alue (ks. kohta 2)
- aivohalvaus
- sydänkohtaus, joka johtuu verenvirtauksen estymisestä tai vähentymisestä sydämeen
- sydämen sähköisen aktiivisuuden muutokset tai rytmihäiriöt
- seesteen kertyminen sydänpussiin (perikardiaalinen effuusio)
- maksan vajaatoiminta
- vatsakipu, joka johtuu haimatulehdusta
- kasvaimen tuhoutumisesta johtuva puhkeama ruoansulatuskanavassa
- sappirakkotulehdus (turvotus ja punoitus), johon voi liittyä sappikiviä
- poikkeava yhdystie kehon onkalosta toiseen tai ihoon
- suu-, hammas- ja/tai leukakipu, turvotus tai haavaumat suun sisällä, tunnottomuus tai painon tunne leuassa, hampaiden löystyminen. Nämä voivat olla merkkejä tai oireita leukaluun vauriosta (osteonekroosista), ks. kohta 2.
- kilpirauhashormonien ylituotanto, joka lisää elimistön levossa käyttämän energian kulutusta
- vaikeudet haavan paranemisessa leikkauksen jälkeen
- suurentunut lihaksen erittämän entsyymin (kreatiinikinaasin) pitoisuus veressä
- voimakas yliherkkysreaktio allergielle mukaan lukien heinänuha, ihottuma, ihon kutiaminen, nokkosrokko, kehon osien turvotus ja hengitysvaikeudet
- paksusuolitulehdus (koliitti, iskeeminen koliitti).

**Harvinaiset:** esiintyvät enintään 1 henkilöllä 1 000:sta

- ihon ja/tai limakalvojen vakavat reaktiot (Stevens-Johnsonin oireyhtymä, toksinen epidermaalinen nekrolyysi, *erythema multiforme*)
- tuumorillysioreyhtymä – joukko metabolisia komplikaatioita, joita voi esiintyä syöpähoidon aikana. Komplikaatiot syntyvät tuhoutuvien syöpäsolujen hajoamistuotteiden seurauksena. Oireisiin voivat kuulua pahoinvointi, hengenahdistus, epäsäännöllinen sydämen syke, lihaskouristikset, kouristuskohtaukset, virtsan sameus ja väsymys sekä samanaikaiset laboratoriotutkimusten poikkeavat tulokset (veren suuri kalium-, virtsahappo- ja fosforipitoisuus sekä pieni kalsiumpitoisuus). Oireyhtymä voi johtaa muutoksiin munuaisten toiminnassa ja

akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan.

- epätavallinen lihassolujen vaurioituminen, joka voi johtaa munuaisvaivoihin (rabdomyolyysi)
- epänormaalit muutokset aivoissa, mistä voi aiheutua joukko oireita, mukaan lukien päänsärky, sekavuus, kouristuskohtaukset ja näön menetys (posteriorinen reversiibeli leukoenkefalopatia -oireyhtymä)
- kivulias ihmisen haavautuminen (*pyoderma gangrenosum*)
- maksatulehdus (hepatiitti)
- kilpirauhastulehdus
- pienten verisuonten vaurioituminen, jota kutsutaan tromboottiseksi mikroangiopatiaksi (TMA).

**Tuntematon:** koska saatavissa oleva tieto ei riitä arvointiin

- verisuonen seinämän laajentuma ja heikentymä tai verisuonen seinämän repeämä (aneurysmat ja valtimon dissekaatiot).
- tarmottomuus, sekavuus, uneliaisuus, tajuttomuus/kooma – nämä oireet voivat olla merkkejä aivotoksisuudesta, joka aiheutuu veren korkeista ammoniakkipitoisuksista (hyperammoneeminen encefalopatia).

### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www.fimea.fi  
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
00034 Fimea

## 5. Sunitinib ratiopharmin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, purkissa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (EXP). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Säilytä alle 30 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat, että pakaus on vaurioitunut tai siinä on merkkejä kajoamisesta.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

## 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

### Mitä Sunitinib ratiopharm sisältää

#### Sunitinib ratiopharm 12,5 mg kovat kapselit

Vaikuttava aine on sunitinibi. Yhdessä kapselissa on 12,5 mg sunitinibia.

#### Sunitinib ratiopharm 25 mg kovat kapselit

Vaikuttava aine on sunitinibi. Yhdessä kapselissa on 25 mg sunitinibia.

#### Sunitinib ratiopharm 50 mg kovat kapselit

Vaikuttava aine on sunitinibi. Yhdessä kapselissa on 50 mg sunitinibia.

**Muut aineet kapseleissa ovat:**

*Kapselin sisältö*: mannitoli, povidoni K-25, kroskarmelloosinatrium ja magnesiumstearaatti.

*Kapselikuori*: liivate, titaanidioksidi (E171), punainen ja keltainen rautaoksidi (E172).

*Painomuste*: shellakka, musta rautaoksidi (E172), propyleeniglykoli, väkevä ammoniakki, kaliumhydroksidi.

**Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauskoot****Sunitinib ratiopharm 12,5 mg kovat kapselit**

Kova liivatekapseli, jossa on läpinäkymätön, keskioranssi kansi- ja pohjaosa. Kansiosaan on mustalla værillä painettu "12,5". Kokoa 4 (kokonaispituus suljettuna noin 14,2 mm) olevat kapselit sisältävät oranssinvärisiä jauherakeita.

**Sunitinib ratiopharm 25 mg kovat kapselit**

Kova liivatekapseli, jossa on läpinäkymätön, vaalean oranssi kansiosa ja keskioranssi pohjaosa.

Kansiosaan on mustalla værillä painettu "25". Kokoa 3 (kokonaispituus suljettuna noin 15,8 mm) olevat kapselit sisältävät oranssinvärisiä jauherakeita.

**Sunitinib ratiopharm 50 mg kovat kapselit**

Kova liivatekapseli, jossa on läpinäkymätön vaalean oranssi kansi- ja pohjaosa. Kansiosaan on mustalla værillä painettu "50". Kokoa 2 (kokonaispituus suljettuna noin 17,6 mm) olevat kapselit sisältävät oranssinvärisiä jauherakeita.

**Pakkauskoot**

Sunitinib ratiopharmia on saatavana 30 kapselin HDPE-muovipurkeissa, 28 ja 30 kapselia sisältävissä läpipainopakkauksissa ja 28 x1 sekä 30 x1 kapselia sisältävissä kapseleittain perforoiduissa läpipainolevyissä.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

**Myyntiluvan haltija**

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

D-89079 Ulm

Saksa

**Valmistajat**

Teva Operations Poland Sp. z.o.o

ul. Mogilska 80

31-546 Kraków

Puola

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Saksa

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

10000 Zagreb

Kroatia

Actavis International Ltd.

4 Sqaq tal-Gidi off Valletta Road

Luqa LQA 6000

Malta

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.  
2600 Dupnitsa  
Bulgaria

*Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:*  
Teva Finland Oy

PL 67  
02631 Espoo  
Puh: 020 180 5900

**Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.5.2024.**

## Bipacksedel: Information till användaren

**Sunitinib ratiopharm 12,5 mg hårda kapslar**  
**Sunitinib ratiopharm 25 mg hårda kapslar**  
**Sunitinib ratiopharm 50 mg hårda kapslar**  
sunitinib

**Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.**

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

**I denna bipacksedel finns information om följande:**

1. Vad Sunitinib ratiopharm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Sunitinib ratiopharm
3. Hur du använder Sunitinib ratiopharm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Sunitinib ratiopharm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### **1. Vad Sunitinib ratiopharm är och vad det används för**

Sunitinib ratiopharm innehåller den aktiva substansen sunitinib, som är en proteinkinashämmare. Det används vid behandling av cancer för att hindra aktiviteten hos en viss typ av proteiner som man vet är verksamma vid tillväxt och spridning av cancerceller.

Sunitinib ratiopharm används för att behandla följande cancerformer:

- Gastrointestinal stromacellstumör (GIST), en typ av cancer i magsäcken och tarmarna. Sunitinib ratiopharm används om imatinib (ett annat cancerläkemedel) inte längre har någon verkan eller om du inte kan ta imatinib.
- Metastaserad njurcellscancer (MRCC), en typ av njurcancer som har spridit sig till andra delar av kroppen.
- Neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln (pNET) (tumör i de hormonproducerande cellerna i bukspottkörteln), när cancer har förvärrats eller inte kan opereras.

Om du undrar över hur Sunitinib ratiopharm verkar eller varför detta läkemedel har ordinerats till dig, kontakta läkaren.

### **2. Vad du behöver veta innan du använder Sunitinib ratiopharm**

#### **Använd INTE Sunitinib ratiopharm**

- om du är allergisk mot sunitinib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

#### **Varningar och försiktighet**

#### **Tala med läkare innan du tar Sunitinib ratiopharm:**

- **Om du har högt blodtryck.** Sunitinib ratiopharm kan höja blodtrycket. Din läkare kan vilja kontrollera ditt blodtryck under behandlingen med Sunitinib ratiopharm och du får eventuellt behandling för att sänka blodtrycket, om det skulle behövas.

- **Om du har eller har haft någon blodsjukdom, problem med blödningar eller blåmärken.** En behandling med Sunitinib ratiopharm kan leda till högre blödningsrisk eller en förändring i antalet av vissa celler i blodet, vilket kan ge anemi (blodbrist) eller påverka blodets förmåga att leveras. Om du tar läkemedel som tunnar ut blodet för att förhindra blodproppar, t.ex. warfarin eller acenokumarol, kan blödningsrisken vara förhöjd. Tala om för din läkare om du får en blödning när du behandlas med Sunitinib ratiopharm.
- **Om du har problem med hjärtat.** Sunitinib ratiopharm kan orsaka hjärtproblem. Tala om för din läkare om du känner dig väldigt trött, är andfådd eller har svullna fötter och fotleder.
- **Om hjärtrytmen blir onormal.** Sunitinib ratiopharm kan ge onormal hjärtrytm. Din läkare kan ta ett EKG för att bedöma dessa problem under behandlingen med Sunitinib ratiopharm. Berätta för din läkare om du känner dig yr, svimfärdig eller får onormala hjärtslag när du tar Sunitinib ratiopharm.
- **Om du nyligen haft problem med blodproppar i vener och/eller artärer (olika typer av blodkärl), inklusive stroke, hjärtinfarkt, embolism eller trombos.** Kontakta din läkare omedelbart om du känner några symtom som bröstsmärta eller tryck över bröstet, smärta i armarna, ryggen, halsen eller käken, andfåddhet, domningar eller svaghet i ena kroppshalvan, problem att tala, huvudvärk eller yrsel medan du behandlas med Sunitinib ratiopharm.
- Om du har eller har haft en aneurysm (förstoring och försvagning av en kärvägg) eller en bristning i en kärvägg.
- **Om du har eller har haft skador i de minsta blodkärlen, vilket kallas för trombotisk mikroangiopati (TMA).** Tala om för din läkare om du får feber, utmattning, trötthet, blåmärken, blödning, svullnad, förvirring, synbortfall och krampanfall.
- **Om du har problem med sköldkörteln.** Sunitinib ratiopharm kan orsaka problem med sköldkörteln. Berätta för din läkare om du lättare blir trött, fryser mer än andra eller om din röst blir djupare när du tar Sunitinib ratiopharm. Sköldkörtelfunktionen bör kontrolleras innan du tar Sunitinib ratiopharm och regelbundet medan du tar det. Om din sköldkörtel inte producerar tillräckligt mycket sköldkörtelhormon kan du få behandling med sköldkörtelhormonersättning.
- **Om du har eller har haft någon sjukdom i bukspottkörteln eller gallblåsan.** Berätta för din läkare om du får något av följande tecken eller symtom: smärta i området runt magsäcken (övre delen av buken), illamående, kräkningar och feber. Dessa kan vara orsakade av en inflammation i bukspottkörteln eller gallblåsan.
- **Om du har eller har haft problem med levern.** Tala om för din läkare om du får något av följande tecken eller symtom på leverproblem under behandlingen med Sunitinib ratiopharm: klåda, gulfärgning av ögon eller hud, mörk urin och smärta eller obehag i övre högra delen av buken. Din läkare bör ta blodprover för att kontrollera leverfunktionen före och under behandlingen med Sunitinib ratiopharm, efter behov.
- **Om du har eller har haft problem med njurarna.** Din läkare kommer att övervaka din njurfunktion.
- **Om du ska opereras eller nyligen har opererats.** Sunitinib ratiopharm kan påverka sårläkningen. Oftast slutar man använda Sunitinib ratiopharm före en operation. Din läkare avgör när du kan börja ta Sunitinib ratiopharm igen.
- **Läkaren kan rekommendera dig att låta göra en kontroll hos tandläkaren innan du börjar behandlingen med Sunitinib ratiopharm.**
  - Om du har eller har haft ont i munnen, tänderna och/eller käken, svullnader eller sår i

- munnen, om du känner en domning eller tyngdkänsla i käken, eller om en tand lossnar - kontakta läkare och tandläkare **omedelbart**.
- Om du behöver genomgå någon invasiv tandbehandling eller tandkirurgi ska du tala om för tandläkaren att du behandlas med Sunitinib ratiopharm, särskilt om du även får eller har fått bisfosfonater intravenöst (i ett kärl). Bisfosfonater används för att förhindra skelettkomplikationer och kan ha getts till dig för att behandla en annan åkomma.
  - **Om du har eller har haft problem med huden och subkutana vävnader.** När du tar detta läkemedel, kan tillståndet "pyoderma gangrenosum" (smärtsamma sår på huden) eller "nekrotiserande fasciit" (snabbt förlöpande infektion i hud/mjukdelar som kan vara livshotande) uppkomma. Kontakta omedelbart läkare om du får symptom på infektion runt en skada på huden, inklusive feber, smärta, rodnad, svullnad, eller om var eller blod sipprar ut från såret. Denna biverkning försvisser oftast när behandlingen med sunitinib avslutas. Svåra hudutslag (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, *erytema multiforme*) har rapporterats vid behandling med sunitinib. Dessa uppstår initialt som rödskiftande, cirkulära, måltavleliknande fläckar eller som runda fläckar med en central blåsa på bålen. Utslagen kan utvecklas till utbredd blåsbildning eller fjällning av huden och kan vara livshotande. Om du får hudutslag eller dessa hudsymtom, ska du **omedelbart** vända dig till läkare.
  - **Om du har eller har haft kramper.** Meddela din läkare snarast om du får högt blodtryck, huvudvärk eller synförluster.
  - **Om du har diabetes.** Hos diabetespatienter bör blodsockernivåerna kontrolleras regelbundet för att avgöra om doseringen av diabetesläkemedlen behöver justeras. Detta för att minimera risken för lågt blodsocker. Meddela din läkare så snart som möjligt om du upplever några tecken och symptom på lågt blodsocker (trötthet, hjärtklappling, svettningar, hunger och medvetslöshet).

## Barn och ungdomar

Sunitinib ratiopharm rekommenderas inte till personer under 18 år.

## Andra läkemedel och Sunitinib ratiopharm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Somliga läkemedel kan påverka koncentrationen av Sunitinib ratiopharm i kroppen. Tala om för läkaren om du använder läkemedel som innehåller följande aktiva substanser:

- ketokonazol, itrakonazol – för behandling av svampinfektioner
- erytromycin, klaritromycin, rifampicin – för behandling av infektioner
- ritonavir - för behandling av HIV
- dexametason – en kortikosteroid som används vid olika sjukdomstillstånd (såsom allergier/andningsbesvär eller hudsjukdomar)
- fenytoin, karbamazepin, fenobarbital - för behandling av epilepsi och andra neurologiska tillstånd
- örtpreparat som innehåller johannesört (*Hypericum perforatum*) - används vid depression och ångest.

## Sunitinib ratiopharm med mat och dryck

Undvik att dricka grapefruktjuice medan du behandlas med Sunitinib ratiopharm.

## Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Om det finns risk att du blir gravid ska du använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandlingen med Sunitinib ratiopharm.

Om du ammar, tala med läkaren. Du bör inte amma under tiden då du behandlas med Sunitinib

ratiopharm.

### Körförstånd och användning av maskiner

Om du känner dig yr eller ovanligt trött, var särskilt försiktig när du kör bil eller använder maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

### Sunitinib ratiopharm innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel d.v.s. är näst intill "natriumfritt".

## 3. Hur du använder Sunitinib ratiopharm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Läkaren kommer att ordnara en lämplig dos för dig, beroende på vilken typ av cancer du har. Om du behandlas för:

- GIST eller njurcancer (MRCC) är den vanligaste dosen 50 mg en gång dagligen, som tas i 28 dagar (fyra veckor), följt av 14 dagars (två veckors) uppehåll (utan medicin), i 6-veckorsperioder.
- pNET är den vanliga dosen 37,5 mg en gång dagligen utan något uppehåll.

Läkaren avgör vilken dos som är lämplig för dig, och när och om du behöver sluta med Sunitinib ratiopharm.

Sunitinib ratiopharm kan tas med eller utan mat.

### Om du har tagit för stor mängd av Sunitinib ratiopharm

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta **omedelbart** läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning. Du kan behöva läkartillsyn.

### Om du har glömt att ta Sunitinib ratiopharm

Ta inte dubbeldos för att kompensera för glömd dos.

## 4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Du måste **omedelbart** kontakta din läkare om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar (se även **Vad du behöver veta innan du använder Sunitinib ratiopharm**):

**Hjärtproblem.** Tala om för din läkare om du känner dig mycket trött, andfådd, eller har svullna fötter och fotleder. Detta kan vara symptom på hjärtproblem som hjärtsvikt och problem med hjärtmuskeln (kardiomyopati).

**Problem med lungor eller andning.** Berätta för din läkare om du får hosta, smärkor i bröstet, plötslig andfåddhet eller om du hostar blod. Detta kan vara symptom på lungemboli som uppstår när blodproppar förs till lungorna.

**Njursjukdomar.** Tala om för din läkare om du märker några förändringar i hur ofta du kissar eller

om du inte kissar. Detta kan vara symtom på njursvikt.

**Blödning.** Tala om för din läkare om du får något av dessa symtom eller om du får en allvarlig blödning under behandlingen med Sunitinib ratiopharm: smärtande och svullen buk, kräkningar med blod, svart och klibbig avföring, blod i urinen, huvudvärk, förändrat medvetande- eller sinnestillstånd eller upphostningar av blod eller blodigt slem från lungorna eller luftvägarna.

**Tumörnedbrytning som leder till hål i tarmen.** Berätta för din läkare om du får svåra buksmärter, feber, illamående, kräkningar, blod i avföringen eller förändrade avföringsvanor.

Andra biverkningar som kan uppträda med Sunitinib ratiopharm är:

**Mycket vanliga:** kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

- sänkt antal blodplättar, röda blodkroppar och/eller vita blodkroppar (t.ex. neutrofiler)
- andfåddhet
- högt blodtryck
- extrem trötthet, kraftlöshet
- svullnad på grund av vätskeansamling under huden och runt ögonen, djupt allergiskt utslag
- Smärta/irritation i munnen, munsår, inflammation i munnen, munorrhett, smakstörningar, orolig mage, illamående, kräkningar, diarré, förstopning, buksmärta/-svullnad, nedslatt appetit
- minskad aktivitet i sköldkörteln (hypotyreoidism)
- yrsel
- huvudvärk
- näsblod
- ryggsmärter, smärta i lederna
- smärter i armar och ben
- gulfärgad eller missfärgad hud, ökad pigmentering av huden, förändrad hårfärg, utslag i handflatorna och på fotsulorna, hudutslag, torr hud
- hosta
- feber
- svårigheter att somna.

**Vanliga:** förekommer hos upp till 1 av 10 personer

- proppar i blodkärlen
- bristande blodförsörjning till hjärtmuskeln på grund av tillämpning eller förträngning av hjärtats kranskärl
- bröstsmärter
- minskning av den mängd blod som hjärtat pumpar
- vätskeansamling runt lungorna
- infektioner
- komplikation av svår infektion (infektion i blodet) som kan leda till vävnadsskada, organsvikt och död
- sänkt blodsockernivå (se avsnitt 2)
- proteinläckage i urinen som ibland leder till svullnad
- influensaliknande symptom
- onormala blodvärden, bl.a. för bukspottkörtel- och leverenzymer
- ökad nivå av urinsyra i blodet
- hemorrojder, smärter i ändtarmen, blödningar i tandköttet, svårigheter eller oförmåga att svälja
- bränrande känsa eller smärter på tungan, inflammation i magtarmkanalens slemhinna, ökad mängd gas i magsäck eller tarm
- viktnedgång
- muskuloskeletal smärta (smärta i muskler och skelett), muskelsvaghets, muskeltrötthet, muskelsmärter, muskelspasm
- torrhet i näsan, nästäppa

- ökat tårflöde
- onormal känsel i huden, klåda, fjällande och inflammerad hud, blåsor, acne, missfärgning av naglarna, hårvälfall
- onormal känsla i armar och ben
- onormalt minskad eller ökad känslighet, speciellt för beröring
- halsbränna
- uttorkning
- blodvallningar
- missfärgad urin
- depression
- frossa.

**Mindre vanliga:** förekommer hos upp till 1 av 100 personer

- livshotande infektion i mjukdelar, även runt ändtarm och könsorgan (se avsnitt 2)
- stroke
- hjärtinfarkt orsakad av avbruten eller minskad blodförsörjning till hjärtat
- förändringar i hjärtats elektriska aktivitet eller onormal hjärtrytm
- vätska runt hjärtat (perikardiell utgjutning)
- leversvikt
- buksmärter förorsakade av inflammation i bukspottkörteln
- tumörnedbrytning som leder till hål i tarmen (perforation)
- inflammation (svullnad och rodnad) i gallblåsan, med eller utan gallsten
- onormal kanal från en normal kroppshållighet till en annan eller till huden (fistel)
- smärta i munnen, tänderna och/eller käken, svullnad och sår inne i munnen, domningar eller en tyngdkänsla i käken, eller tandlossning. Detta kan vara symptom på skelettskada i käken (osteonekros), se avsnitt 2.
- överproduktion av sköldkörtelhormon, vilket ökar kroppens energiförbrukning i vila
- problem med sårläckning efter kirurgi
- ökad halt av muskelenzym (kreatinfosfokinas) i blodet
- stark reaktion på någon allergen inklusive hösnuva, hudutslag, klåda, nässelfeber, svullnad av kroppsdelar och svårigheter att andas
- inflammation i tjocktarmen (kolit, ischemisk kolit).

**Sällsynta:** förekommer hos upp till 1 av 1 000 personer

- svåra reaktioner på huden och/eller slemhinnorna (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys, *erytema multiforme*)
- tumörlyssyndrom (TLS) – TLS är en grupp av komplikationer som rör ämnesomsättningen och som kan uppstå vid cancerbehandling. Dessa komplikationer orsakas av nedbrytningsprodukter från döende cancerceller och symptomen kan vara följande: illamående, andfåddhet, oregelbunden puls, muskelkrämper, krampfall, grumlig urin och trötthet sammantaget med onormala laboratorievärden (höga kalium-, urinsyra- och fosfatnivåer och låga kalciumnivåer i blodet). Komplikationerna kan leda till förändrad njurfunktion och akut njursvikt.
- onormal nedbrytning av muskelvävnad, vilket kan leda till njurproblem (rabdomolyys)
- onormala förändringar i hjärnan, vilket kan orsaka ett antal symptom, inkluderande huvudvärk, förvirring, krämper och synbortfall (reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom)
- smärtsamma sår på huden (*pyoderma gangrenosum*)
- inflammation i levern (hepatit)
- inflammation i sköldkörteln
- skador på de minsta blodkärlen, vilket kallas för trombotisk mikroangiopathi (TMA).

**Ingen känd frekvens:** kan inte beräknas från tillgängliga data

- en förstoring och försvagning av en kärlvägg eller en bristning i en kärlvägg (aneurysmer och arteriella dissektioner).
- brist på energi, förvirring, dåsigitet, medvetlöshet/koma – dessa symptom kan vara tecken på

hjärntoxicitet orsakat av höga nivåer av ammoniak i blodet (hyperammonemisk encefalopati).

## Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

[www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

## 5. Hur Sunitinib ratiopharm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen, burken och blisterkartan efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30 °C, i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använd inte detta läkemedel om du ser att förpackningen är skadad eller verkar ha öppnats.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

## 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

### Innehållsdeklaration

#### Sunitinib ratiopharm 12,5 mg hård kapslar

Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller 12,5 mg sunitinib.

#### Sunitinib ratiopharm 25 mg hård kapslar

Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller 25 mg sunitinib.

#### Sunitinib ratiopharm 50 mg hård kapslar

Den aktiva substansen är sunitinib. Varje kapsel innehåller 50 mg sunitinib.

### Övriga innehållsämnen är:

*Kapselinnehåll:*mannitol, povidon K-25, kroskarmelosnatrium och magnesiumstearat.

*Kapselskal:* gelatin, titandioxid (E171), röd och gul järnoxid (E172).

*Trycksvärta:* shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol, koncentrerad ammoniak, kaliumhydroxid.

### Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

#### Sunitinib ratiopharm 12,5 mg hård kapslar

Hård gelatinkapsel med medelorange, ogenomskinlig över- och underdel. Märkt med ”12,5” i svart bläck på överdelen. Kapselstorlek 4 (total längd då kapseln är stängd: ca 14,2 mm). Kapslarna innehåller orange pulvergranulat.

#### Sunitinib ratiopharm 25 mg hård kapslar

Hård gelatinkapsel med ljusorange, ogenomskinlig överdel och medelorange underdel. Märkt med ”25” i svart bläck på överdelen. Kapselstorlek 3 (total längd då kapseln är stängd: ca 15,8 mm). Kapslarna innehåller orange pulvergranulat.

#### Sunitinib ratiopharm 50 mg hård kapslar

Hård gelatinkapsel med ljusorange, ogenomskinlig över- och underdel. Märkt med ”50” i svart bläck på överdelen. Kapselstorlek 2 (total längd då kapseln är stängd: ca 17,6 mm). Kapslarna innehåller orange pulvergranulat.

**Förpackningsstorlekar**

Tillhandahålls i HDPE-plastburkar med 30 kapslar och blisterförpackningar med 28 och 30 kapslar samt perforerade endosblisterförpackningar med 28 x 1 och 30 x 1 kapslar.  
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

**Innehavare av godkännande för försäljning**

riatiopharm GmbH  
Graf-Arco-Strasse 3  
D-89079 Ulm  
Tyskland

**Tillverkare**

Teva Operations Poland Sp. z.o.o  
ul. Mogilska 80  
31-546 Kraków  
Polen

Merckle GmbH  
Ludwig-Merckle-Strasse 3  
89143 Blaubeuren  
Tyskland

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)  
Prilaz baruna Filipovića 25  
10000 Zagreb  
Kroatien

Actavis International Ltd.  
4 Sqaq tal-Gidi off Valletta Road  
Luqa LQA 6000  
Malta

Balkanpharma-Dupnitsa AD  
3 Samokovsko Shosse Str.  
2600 Dupnitsa  
Bulgarien

*Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:*

Teva Finland Oy  
PB 67  
02631 Esbo  
Tel: 020 180 5900

**Denna bipacksedel ändrades senast den 20.5.2024.**