

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Oxamin 15 mg tabletti

Oksatsepaami

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysytävä, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen.
- Tämä lääke on määritty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai apteekkienkilökunnan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Oxamin on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oxaminia
3. Miten Oxaminia käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Oxaminin säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Oxamin on ja mihin sitä käytetään

Oxaminin sisältämä oksatsepaami on bentsodiatsepiinien ryhmään kuuluva uni- ja rauhoittava lääke. Oksatsepaami vaikuttaa voimistamalla pääasiassa keskushermostossa esiintyvän välittäjääaineen toimintaa, joka puolestaan lieventää elimistön erilaisia jännitys- ja kiihtymystiloja.

Oxamin-valmistetta käytetään ahdistuneisuuden, jännittyneisyden ja rauhattomuuden lievittämiseen sekä unettomuuden hoitoon ahdistuneilla potilailla sekä lisäksi vaikeiden masennustilojen hoitoon yhdessä masennuslääkkeiden kanssa.

Oksatsepaamia, jota Oxamin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkienkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Oxaminia

Älä käytä Oxaminia, jos:

- olet allerginen oksatsepaamille, muille bentsodiatsepiineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- sinulla on todettu vaikea hengitysvajaus
- sinulla on todettu halvausmaininen lihasheikkoustauti (*myasthenia gravis*)
- sinulla on todettu vaikea uniapnea (toistuvia unenaikaisia hengityskatkoksia)
- sinulla on todettu äkillinen alkoholi-, unilääke- tai muu lääkeainemyrkkytys.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Oxaminia, jos sinulla on:

- tai on aiemmin ollut alkoholi- tai huumausaineongelma
- todettu maksan tai munuaisten vajaatoiminta
- todettu uniapnea
- todettu aivovamma.

Ohjeen mukainen annostus saattaa heikentää reaktiokykyä erityisesti hoidon alkuvaiheessa ja yhteisvaikutuksessa alkoholin kanssa. Pitkääikäinen käyttö saattaa johtaa riippuvuuteen ja annoksen suurentamiseen johtavaan tottumiseen.

Mm. kouristuksina ilmeneviä vieroitusoireita saattaa esiintyä pitkääikaista ja suuriannoksista hoitoa lopettaessa. Tämän vuoksi pitkääikäinen käyttö tulisi lopettaa annostusta asteittain pienentämällä.

Muut lääkevalmisteet ja Oxamin

Kerro lääkärille tai apteekkienkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä.

Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille jos:

- sinulle on määritty tai Oxamin-hoidon aikana määritään muita keskushermostoon vaikuttavia lääkeitä, kuten unilääkeitä, masennuslääkeitä, antipsykootteja tai epilepsialääkeitä, koska keskushermosta lamaava vaikutus voimistuu yhteiskäytössä.
- käytät sisapridia (mahalääke), koska se saattaa väliaikaisesti lisätä oksatsepaamin vaikutusta lisäämällä sen imetymistä.
- käytät erytromysiiniä (antibiootti) tai simetidiiniä (mahalääke), sillä niiden vaikutuksesta oksatsepaamin pitoisuus elimistössä voi nousta.
- jos käytät antihistamiinia(allergialääke).

Oxamin-valmisten ja opioidien (voimakkaita kipulääkeitä, korvaushoidossa käytettäviä lääkeitä ja tiettyjä yskänlääkeitä) samanaikainen käyttö lisää uneliaisuuden, hengitysvaikeuksien (hengityslaman) ja kooman riskiä, ja se voi olla henkeä uhkaavaa. Sen vuoksi samanaikaista käyttöä voidaan harkita vain, jos muut hoitovaihtoehdot eivät ole mahdollisia.

Jos lääkäri määräää sinulle Oxamin-valmistetta samanaikaisesti opioidien kanssa, annosta ja samanaikaisen hoidon kesto on rajoitettava.

Kerro lääkärille kaikista käyttämistäsi opioideista, ja noudata huolellisesti lääkäriltä saamiasi annostussuosituksia. Voi olla hyödyllistä kertoa läheisille ylläkuватuista opioidien kanssa samanaikaiseen käyttöön liittyvistä oireista ja merkeistä. On otettava yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu tällaisia oireita.

Oxamin ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

Oxamin voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.

Alkoholin samanaikaista käyttöä Oxamin-hoidon aikana tulee välttää, koska alkoholi ja oksatsepaami voimistavat toistensa vaikutuksia. Oxaminin ja alkoholin yhteiskäyttö on potentiaalisesti hengenvaarallista.

Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Oxaminin käyttöä ei suositella raskauden ja imetyksen aikana.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Pakkaus on merkitty punaisella varoituskolmiolla, mikä tarkoittaa, että Oxamin voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. Ohjeen mukainen annostus saattaa heikentää reaktiokykyä erityisesti hoidon alkuvaiheessa ja yhteisvaikutuksessa alkoholin kanssa. Liikenteessä sekä koneiden ja laitteiden käytössä voi ilmetä vaikeuksia vielä oksatsepaamin nauttimista seuraavinakin päivinä. On omalla vastuullasi arvioda, pystykö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastuksekseen. Keskustele lääkärin tai apteekkienkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Oxamin sisältää laktoosia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.

3. Miten Oxaminia käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määränyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa. Lääkitys tulee lopettaa annosta asteittain vähentämällä.

Tabletit niellään runsaan nesteen kera.

Käyttö lapsille ja nuorille

Alle 12-vuotiaille lapsille ainoastaan erikoislääkärin valvonnassa.

Jos otat enemmän Oxaminia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokesukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

Jos unohdat ottaa Oxaminia

Älä otta kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen, vaan jatka lääkitystä ohjeistetulla tavalla.

Jos lopetat Oxaminin käytön

Älä lopeta tämän lääkkeen käyttöä äkillisesti, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin. Jos lopetat lääkkeen käytön, keskustele siitä ensin lääkärin kanssa. Lääkäri neuvoa sinua, milloin ja miten lääkkeen käyttö lopetetaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Haittavaikutukset riippuvat annoksen suuruudesta ja niiden esiintymistodennäköisyys on suurempi jäkkäillä ja heikkokuntoisilla potilailla sekä munuaisten tai maksan toiminnanvauksen yhteydessä.

Yleiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 10:stä)

Yleisin haittavaikutus on väsymys, jota esiintyy erityisesti hoidon alussa ja joka usein häviää ensimmäisten hoitopäivien jalkeen. Mahdollinen uniapnea (unen aikaiset hengityskatkot) voi myös pahentua suhteellisen suuria annoksia käytettäessä.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 100:sta)

Melko harvinaisia haittavaikutuksia ovat huimaus ja päänsärky, liikkeiden epävarmuus sekä lihasheikkous ja anterogradinen muistamattomuus (uudet asiat ja tapahtumat eivät jää mieleen).

Harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät enintään 1 lääkkeen käyttäjällä 1 000:sta)

Harvinaisia haittavaikutuksia ovat allergiset ihoreaktiot, sekavuus, unettomuus sekä ns. paradoksaaliset reaktiot (kihtymystilat, aggressiivisuus ja hallusinaatiot).

Lääke voi myös johtaa poikkeaviin maksan toimintakoeарvoihin ja verenkuvamuutoksiin.

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (esiintyvät harvemmalli kuin 1 lääkkeen käyttäjällä 10 000:sta)
Hyvin harvoin on todettu kuukautishäiriötä, ruokahalun lisääntymistä, puhe- ja näköhäiriötä sekä sukupuolivietin muutoksia.

Pitkääikainen käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta eikä käyttöä saa lopettaa äkillisesti, vaan annostusta on pienennettävä vähitellen. Hoidon äkillinen keskeyttäminen voi aiheuttaa vieroitusoireita, kuten ahdistuneisuutta, unettomuutta ja kouristuksia.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

5. Oxaminin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Säilytä alle 25 °C:ssa. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

Älä käytä tästä läkettä pakkaussessa mainitun viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Oxamin sisältää

Vaikuttava aine on oksatsepaami.

Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti, maissitarikkelys, mikrokiteinen selluloosa, kopovidoni, talkki, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkauuskoot

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre, halkaisija 8 mm. Jakouurre helpottaa tabletin puolittamista ja se on tarkoitettu ainoastaan nielemisen helpottamiseksi, ei annoksen puolittamiseksi.

30 ja 100 tablettia PVC/alumiiniläpipainopakkauksessa.

Kaikkia pakkaukokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm GmbH, Ulm, Saksa

Valmistaja

Merckle GmbH, Blaubeuren, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy
PL 67
02631 Espoo
Puh: 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.12.2019.

Bipacksedel: Information till patienten

Oxamin 15 mg tablett Oxazepam

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Oxamin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Oxamin
3. Hur du använder Oxamin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Oxamin ska förvaras
6. Förfäckningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Oxamin är och vad det används för

Oxazepamet i Oxamin är ett sömn- och lugnande läkemedel, som tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner. Oxazepamet förstärker effekten av den i huvudsakligen det centrala nervsystemet förekommande signalsubstansen, som i sin tur lindrar olika spännings- och upphetsningstillstånd i kroppen.

Oxamin-preparatet används för lindring av spänning, ångest och rastlöshet samt för behandling av sömnlöshet hos patienter med ångest och för behandling av svåra depressionstillstånd tillsammans med antidepressiva medel.

Oxazepam som finns i Oxamin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Oxamin

Använd inte Oxamin om du:

- är allergisk mot oxazepam, andra bensodiazepiner eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- har svårt nedsatt andning
- om du har förlamande muskelsvaghet (*myasthenia gravis*)
- har svår sömnapné (upprepade andningsuppehåll under sömnen)
- om du har akut alkohol-, sömnmedicin- eller annan läkemedelsförgiftning.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Oxamin om du:

- har eller tidigare har haft alkohol- eller narkotikaproblem
- har nedsatt njur- eller leverfunktion
- har sömnapné
- har hjärnskada.

Doseringen kan inverka på reaktionsförmågan speciellt i början av behandlingen och vid samtidigt intag av alkohol. Långvarig användning av oxazepam kan framkalla beroende och leda till ett behov att öka dosen.

Bl.a. spasmer kan uppträda som abstinenssymtom vid avslutning av långtidsvård eller högre doseringar. Därför bör långtidsvård avslutas med gradvis minskning av doseringen.

Andra läkemedel och Oxamin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med:

- läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet såsom sömnmedel, depressionsläkemedel, neuroleptika eller epilepsiläkemedel eftersom den hämmande effekten på det centrala nervsystemet förstärks vid samtidig användning
- cisaprid (magmedicin) för det kan tillfälligt öka effekten av oxazepam genom att öka dess upptag
- erytromycin (antibiotikum) eller simetidin (magmedicin) för det kan öka halten av oxazepam i kroppen
- antihistamin (medel mot allergi).

Samtidig användning av Oxamin och opioider (starka smärtstillande medel, läkemedel för substitutionsbehandling och vissa hostmediciner) ökar risken för sömnighet, andningssvårigheter (andningsdepression) och koma vilket kan vara livshotande. På grund av detta bör samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.

Om läkaren förskriver Oxamin samtidigt med opioider, bör dosen och behandlingstiden begränsas.

Berätta för läkaren om du tar opioider och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om riskerna som är beskrivna ovan. Läkaren måste kontaktas om du får dessa symtom.

Oxamin med mat, dryck och alkohol

Oxamin kan tas på fastande mage/mellan måltider eller i samband med måltid och tas tillsammans med vätska.

Användning av alkohol under Oxamin behandlingen bör undvikas, eftersom alkohol och oxazepam förstärker varandras effekter. Samtidig användning av alkohol och Oxamin är potentiellt livsfarligt.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Användning av Oxamin rekommenderas inte under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Förpackningen är försedd med en röd varningstriangel, vilket betyder att Oxamin kan försämra reaktionsförmågan så att körförmågan och förmågan att utföra koncentrationskrävande uppgifter försämras. Doseringen kan inverka på reaktionsförmågan speciellt i början av behandlingen och vid samtidigt intag av alkohol. Ånnu några dagar efter intag av oxazepam kan reaktionsförmågan vara nedsatt vid bilkörning samt vid precisionsbetonat arbete med maskiner och apparater. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Oxamin innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

3. Hur du använder Oxamin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ändra eller avbryt inte medicineringen utan att först kontakta din läkare. När behandlingen skall avslutas, bör detta ske genom en stegvis minskning av dosen.

Tabletterna sväljes med en riklig mängd vatten.

Användning för barn och ungdomar

Barn under 12 år bör endast behandlas under övervakning av specialist.

Om du har tagit för stor mängd av Oxamin

Om du fått i dig en alltför stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 0800 147 111) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Oxamin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan ta den följande dosen vid den normala tidpunkten.

Om du slutar att ta Oxamin

Du bör inte plötsligt sluta ta detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om du vill sluta ta ditt läkemedel ska du först diskutera det med läkaren. Läkaren kommer att berätta för dig när och hur du kan sluta.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningarna är dosberoende och sannolikare hos äldre och försvagade patienter, samt hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

Den vanligaste biverkningen är trötthet, vilket förekommer speciellt i början av behandlingen och som ofta avtar efter några dagar. Eventuell sömnapné (andningsuppehåll i sömnen) kan också förvärras om Oxamin används i relativt stora doser.

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)

Mindre vanliga biverkningar är yrsel och huvudvärk, osäkra rörelser och muskelsvaghets samt anterograd amnesi (minnesförlust som gäller nya händelser).

Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare)

Sällsynta biverkningar är allergiska hudreaktioner, förvirring, sömnlöshet och s.k. paradoxala reaktioner (upphetsningstillstånd, aggressivitet och hallucinationer). Detta läkemedel kan också leda till avvikande resultat i leverfunktionstest och förändringar i blodbilden.

Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

I mycket sällsynta fall har menstruationsstörningar, ökning av matlusten, tal- och synstörningar samt förändringar i sexualdriften förekommit.

Långvarig användning kan framkalla beroende och behandlingen får inte avslutas plötsligt, utan doseringen bör minskas stegvis. Ett plötsligt avbrott i behandlingen kan förorsaka abstinenbesvär såsom ångest, sömnlöshet och kramper.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 Fimea

5. Hur Oxamin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Använts före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är oxazepam.

Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, kopovidon, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund, bikonvex tablett med en brytskåra på ena sidan, diameter 8 mm. Skåran är endast avsedd att underlätta delning och därmed underlätta sväljning. Skåran delar inte tabletten i lika doser.

30 och 100 tablettor i PVC/aluminiumblisterkortor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH, Ulm, Tyskland

Tillverkare

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

Teva Finland Oy

PB 67

02631 Esbo

Tel: 020 180 5900

Denna bipacksedel ändrades senast den 27.12.2019.